

FIC-blok in de prehospitalale zorg

Minder pijn. Minder opioïden. Een betere start van de behandeling.

Binnen RAV Brabant Midden-West-Noord kunnen verpleegkundig specialisten en physician assistants in de prehospitalale fase een fascia iliaca compartiment blok (FIC-blok) uitvoeren. Deze regionale zenuwblokkade biedt effectieve pijnstilling bij patiënten met een verdenking op een heupfractuur of een proximale femurfractuur.

"Goede pijnstilling begint al vóór het ziekenhuis."

Waarom een FIC-blok?

Patiënten met letsel in de heupregio ervaren vaak ernstige pijn, vooral tijdens mobilisatie en transport. Het FIC-blok zorgt voor:

- Snelle en effectieve pijnverlichting
- Minder behoefte aan opioïden
- Minder kans op bijwerkingen en delier
- Meer comfort tijdens vervoer en positioneren

Ook inzetbaar in de palliatieve zorg

Het FIC-blok kan ook worden ingezet bij ernstige pijn in de heupregio binnen de palliatieve zorg. Als overbrugging naar een meer definitieve behandeling kan hiermee snel en op een minimaal invasieve manier pijnverlichting worden geboden.

Wat kunt u als aanvrager doen?

Vraag bij een ambulanceaanvraag voor deze patiëntengroep actief:

"Is een FIC-blok mogelijk bij deze patiënt?"

Zo draagt u bij aan vroege pijnstilling, meer comfort voor de patiënt en een verminderd gebruik van opioïden.

Samen verbeteren we de ketenzorg

Met het FIC-blok brengen we hoogwaardige pijnbestrijding naar de voordeur van de patiënt. Denk bij een verdenking op een heupfractuur aan het FIC-blok en vraag ernaar bij uw ambulanceaanvraag.

Meer informatie:

medisch@ravbrabantmwn.nl



Brabant Midden-West-Noord